

รณรงค์กำจัด **ยุงลาย** ด้วยมาตรการ



กรมควบคุมโรค
Department of Disease Control

เก็บบ้าน

เก็บบ้านให้ปลอดโปร่ง
เพื่อไม่ให้ยุงลายเกาะพัก

เก็บขยะ

เก็บขยะเศษภาชนะ
ที่อาจเป็นแหล่ง
เพาะพันธุ์ยุงลายได้

เก็บน้ำ

ปิดให้มิดชิดไม่ให้ยุงลายวางไข่
ภาชนะที่ปิดฝาไม่ได้
ให้ปล่อยน้ำทิ้งหรือเปลี่ยนน้ำ
เป็นประจำทุกสัปดาห์

3 เก็บ 3 โรค

- ▶ โรคไข้เลือดออก
- ▶ โรคติดเชื้อไวรัสซิกา
- ▶ โรคไข้วอดข้อยุงลาย



DDC
กรมควบคุมโรค
Department of Disease Control

สคร.11 นครศรีธรรมราช
<http://odpc11.ddc.moph.go.th>
www.facebook.com/dpc11.ddc Tel: 075 341 147 Fax: 075 342 328

สายด่วน
กรมควบคุมโรค
1422

ความเข้าใจ

เกี่ยวกับ

ยุงลาย



ถูก



วางไข่
ในภาชนะ
น้ำใส นิ่ง



ชอบกัดในเวลา
กลางวัน



ป้องกันได้
ด้วยมือคุณ

- ☒ เก็บบ้าน
- ☒ เก็บขยะ
- ☒ เก็บน้ำ



พ่นสารเคมีที่ใช้ในการ
ควบคุมโรค



ผิด



วางไข่ในบ่อ น้ำเน่า
ที่ระบายน้ำ



ชอบกัด
เวลากลางคืน



รอให้เจ้าหน้าที่
มาจัดการ

รอผู้มา
จัดการ



พ่นสารเคมี
ที่ใช้ในการ
ป้องกันโรค



Genesis ST_20

65x38 cm.

ชาวสาธารณสุข **รวมพลัง!**

พืษาดยุงลาย ด้วยมาตรการ



3 เก็บ

เก็บบ้านให้ปลอดโปร่ง

ไม่ให้ยุงลายเกาะพัก

เก็บขยะเศษภาชนะ

ไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย

เก็บน้ำปิดให้มิดชิด

ไม่ให้ยุงลายวางไข่



+ 5 ส.


สะอาด สะดวก สะอาด สุขลักษณะ สร้างนิสัย

ทุกวันศุกร์ ในหน่วยงาน และ ที่บ้าน ทุกวันเสาร์ - อาทิตย์

เพื่อความปลอดภยจาก **ไข้เลือดออก ไข้ซิกา และไข้ปวดข้อยุงลาย**

ไข้เลือดออก โรคร้าย ที่มี **ยุง** ลาย เป็นพาหะ

www.kapook.com



อาการ

1 ไข้สูงลอย 39-40 องศา
ปวดเมื่อยตามตัว ปวดศีรษะ
ประมาณ 4-5 วัน



3 ตับโต กดเจ็บ
บริเวณชายโครง
ข้างขวา

2 อาการเลือดออก ต่ายดำ
อาเจียน มีจุดเลือดออกตามตัว



4 ระบบไหลเวียนเลือด
ผิดปกติ หรืออาการช็อก เกิดในช่วงไข้จะลด
กระสับกระส่าย มือเท้าเย็น รอบปากเขียว ชีพจรเบา
และเร็ว ความดันต่ำ

การรักษา

1 ให้ยาลดไข้ ยาลดไข้ที่ควรใช้
คือพาราเซตามอล



2 ให้สารน้ำชดเชย ให้ดื่มน้ำเกลือแร่
บ่อยๆ ในรายที่ขาดน้ำมากๆ



3 ดูแลอาการอย่างใกล้ชิด ถ้าผู้ป่วยมีอาการ
กระสับกระส่าย มือเท้าเย็น คลื่นไส้ อาเจียน
ใจสั่น หน้ามืด ในช่วงไข้ลดให้รีบนำส่ง รพ. ทันที

4 ตรวจเกล็ดเลือดและความเข้มข้นเลือด
เพื่อใช้พิจารณาในการให้สารน้ำชดเชย



การป้องกัน

1 ควบคุมสิ่งแวดล้อม เพื่อไม่ให้มีแหล่ง
เพาะพันธุ์ของยุงลาย เช่น ในบริเวณที่มีน้ำขัง
บ่อน้ำนิ่ง ในแจกันดอกไม้ เป็นต้น

2 ป้องกันส่วนบุคคล ใส่เสื้อแขนยาว
กางเกงขายาว ใช้ยาฆ่ายุง
ใช้กลิ่นกันยุง เป็นต้น



3 ใช้สารเคมีควบคุม ใช้ทรายอะเบท ใช้ยาฆ่า
ลูกน้ำใสในบ่อน้ำ ใช้สารเคมีพ่นตามบ้านเพื่อฆ่า
ยุงลาย และในที่ที่เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย